

H
260
564
52

EXAMINER'S
COPY

DEUTSCHES REICH

Div. 6



AUSGEGEBEN AM
5. MAI 1931

REICHSPATENTAMT
PATENTSCHRIFT

Nr 523 437

KLASSE 12g GRUPPE 32

I 36559 IVa/12g

Tag der Bekanntmachung über die Erteilung des Patents: 2. April 1931


I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. in Frankfurt a. M. *)

Verfahren zur Darstellung von 5-Chlor- und 5-Brom-2-amino-1-alkyloxy- und
1-aralkyloxybenzolen

Zusatz zum Patent 511 468

Patentiert im Deutschen Reiche vom 25. Dezember 1928 ab
Das Hauptpatent hat angefangen am 18. Januar 1928.


Durch das Hauptpatent 511 468 ist ein
Verfahren zur Darstellung von 5-Chlor-2-
amino-1-methoxybenzol geschützt, welches
darin besteht, daß man den symmetrischen
5 Dimethoxydiphenylharnstoff folgender For-
mel:




der Chlorierung unterwirft und das Chlorie-
rungsprodukt aufspaltet. Überraschend war,
15 daß entgegen den bisherigen Erfahrungen bei
der Chlorierung von acyliertem 2-Amino-
1-methoxybenzol das Chlor hier fast ausschließ-
lich in die beiden p-Stellungen zu den beiden
Iminogruppen des Dimethoxydiphenylharn-
20 stoffs eintritt.

Es wurde nun weiter gefunden, daß nicht
nur bei der Chlorierung des in der Haupt-
patentschrift beschriebenen o, o'-Dimethoxy-
diphenylharnstoffs Substitution in den beiden
25 p-Stellungen zu den Iminogruppen erfolgt,
sondern daß allgemein bei der Einwirkung
einer zur Einführung von zwei Chlor- oder
Bromatomen erforderlichen Menge Chlor oder
Brom oder eines Mittels, das aromatische

Kernwasserstoffatome durch diese Halogene 30
zu substituieren vermag, auf einen symmetri-
schen o, o'-disubstituierten Diphenylharnstoff
der folgenden allgemeinen Formel:



worin R Alkyl oder Aralkyl bedeutet, 40
fast ausschließlich eine Dihalogenverbindung
der folgenden allgemeinen Formel erhalten
wird:



worin R Alkyl oder Aralkyl und Hal. Chlor 50
oder Brom bedeutet.

Durch Aufspalten dieser Halogenierungs-
produkte erhält man die bisher schwierig dar-
stellbaren und zum Teil unbekannten 5-Chlor-
(oder 5-Brom-) 2-amino-1-alkyloxy- und ar-
55 alkyloxybenzole in guter Ausbeute.

Die als Ausgangsmaterialien benutzten
symmetrischen o, o'-Dialkyloxy- und o, o'-

*) Von dem Patentsucher ist als der Erfinder angegeben worden:
Dr. Wilhelm Fitzky in Frankfurt a. M.-Höchst.

CB

Diaralkyloxydiphenylharnstoffe sind erhältlich durch Umsetzung der entsprechenden Amine mit Phosgen bei Anwesenheit eines säurebindenden Mittels. Die Halogenierungen können nach den verschiedensten Methoden ausgeführt werden, ohne daß sich das Ergebnis wesentlich ändert.

Die Chlorierung des symmetrischen o, o'-Dimethoxydiphenylharnstoffs sowie die Aufspaltung der dabei erhaltenen Dichlorverbindung ist hier ausgenommen.

Beispiele

1. 140 Gewichtsteile o, o'-Dimethoxydiphenylharnstoff werden in etwa 1000 Gewichtsteilen Tetrachloräthan verteilt. Man läßt nun bei 10 bis 30° unter Rühren 160 Gewichtsteile Brom eintropfen. Nach beendigter Bromierung treibt man das Lösungsmittel mit Wasserdampf ab. Der zurückbleibende, in Wasser unlösliche Dibromdimethoxydiphenylharnstoff vom Schmelzpunkt 235 bis 240° wird ohne Reinigung in einem geschlossenen Gefäß mit 700 Gewichtsteilen Ammoniak 10 Stunden auf 150° erhitzt. Nach dem Erkalten saugt man das rohe 5-Brom-2-amino-1-methoxybenzol ab und löst es in verdünnter Salzsäure. Das salzsaure Salz wird ausgesalzen und, wie üblich, auf die freie reine Base verarbeitet. Das 5-Brom-2-amino-1-methoxybenzol schmilzt bei 60 bis 61°.

2. 150 Gewichtsteile o, o'-Diäthoxydiphenylharnstoff werden in 1000 Gewichtsteilen Tetrachloräthan verteilt. Hierzu läßt man unter Rühren 145 Gewichtsteile Sulfurylchlorid innerhalb 10 bis 20° zutropfen. Nach beendigter Chlorierung wird das Lösungsmittel abdestilliert. Der erhaltene Dichlor-diäthoxydiphenylharnstoff vom Schmelzpunkt 235 bis 240° wird ohne Reinigung nach Zufügen von 200 Gewichtsteilen 25%igem Ammoniak und 500 Gewichtsteilen Wasser in einem geschlossenen Gefäß 5 Stunden auf 150° erhitzt. Nach dem Erkalten wird das rohe 5-Chlor-2-amino-1-äthoxybenzol abgesaugt und in verdünnter Salzsäure gelöst. Das salzsaure Salz wird ausgesalzen und, wie üblich, auf die freie reine Base verarbeitet.

3. 178 Gewichtsteile o, o'-Dibutyloxydiphenylharnstoff werden in 1500 Gewichtsteilen Tetrachloräthan suspendiert. Hierzu läßt man unter Rühren 145 Gewichtsteile Sulfurylchlorid innerhalb 10 bis 30° zutropfen. Nach beendigter Chlorierung wird das Lösungsmittel abdestilliert und der Dichlordibutyloxydiphenylharnstoff vom Schmelzpunkt etwa 120° mit 300 Gewichtsteilen 25%igem Ammoniak und 700 Gewichtsteilen Wasser 6 Stunden auf 180° erhitzt. Nach dem Erkalten wird das

Öl abgetrennt und in verdünnter Salzsäure gelöst. Das salzsaure Salz wird ausgesalzen und, wie üblich, auf die freie reine Base verarbeitet. Das 5-Chlor-2-amino-1-butyloxybenzol ist ein farbloses viskoses Öl, das bei 160° bei 12 mm Druck siedet.


Den Dibutyloxydiphenylharnstoff kann man darstellen aus Phosgen und o-Aminophenylbutyläther; der letztere ist erhältlich aus o-Chlornitrobenzol und Butylalkohol bei Gegenwart eines salzsäurebindenden Mittels und nachfolgender Reduktion.

4. 212 Gewichtsteile o, o'-Dibenzoyloxydiphenylharnstoff werden in 4000 Gewichtsteilen Chlorbenzol gelöst. Hierzu läßt man unter Rühren 145 Gewichtsteile Sulfurylchlorid bei 20 bis 30° zutropfen. Nach beendigter Chlorierung wird das Lösungsmittel mit Wasserdampf abgetrieben, der Dichlordibenzoyloxydiphenylharnstoff vom Schmelzpunkt 180 bis 190° ohne Reinigung mit 700 ccm 25%igem Ammoniak in einem geschlossenen Gefäß 7 Stunden auf 150° erhitzt. Nach dem Erkalten wird das Öl abfiltriert und in verdünnter Salzsäure gelöst. Das salzsaure Salz wird ausgesalzen und, wie üblich, auf die freie reine Base verarbeitet. Das 5-Chlor-2-amino-1-benzoyloxybenzol schmilzt bei 52°.

Den Dibenzoyloxydiphenylharnstoff kann man darstellen aus Phosgen und o-Aminophenylbenzyläther, den letzteren aus o-Nitrophenol und Benzylchlorid bei Gegenwart eines salzsäurebindenden Mittels und nachfolgender Reduktion.

PATENTANSPRUCH:

Weitere Ausbildung des Verfahrens gemäß Patent 511 468, dadurch gekennzeichnet, daß man einen o, o'-disubstituierten symmetrischen Diphenylharnstoff der folgenden Formel:



worin R Alkyl oder Aralkyl bedeutet, mit einer zur Einführung von zwei Chlor- oder Bromatomen erforderlichen Menge Chlor oder Brom oder eines Mittels, das aromatische Kernwasserstoffatome durch diese Halogene zu substituieren vermag, behandelt, wobei jedoch die Chlorierung des symmetrischen o, o'-Dimethoxydiphenylharnstoffs ausgenommen ist und die Halogenierungsprodukte mit alkalisch wirkenden Mitteln aufspaltet.